



Louse and nit on hair shafts.

Reproduced with permission. Copyright © 2015 Scott Camazine, MD, PhD. All rights reserved.

## شپش سر

طول: حدود ۳ میلی متر

۳ جفت پای دارای چنگک در انتهای آن ها دارد

جنس ماده آن به همراه خون خواری تا ۳ ماه روی بدن میتواند زنده بماند و حدود ۳۰۰ تخم بگذارد.

در صورتی جدایی از میزبان طی ۲۴ ساعت می میرد.

تخم شپش (رشک یا Nit) خاکستری، حدود ۱ میلی متر و طی ۶-۱۰ روز نوزاد حشره (Nymph) از آن خارج می شود و طی ۱۰-۱۵ روز بالغ می گردد.

رشک ها معمولا به تنه مو نزدیک پوست سر می چسبند.

حشره بالغ معمولا برای خونخواری خود را به سر می رساند و در سایر اوقات بیشتر در لباس فرد می توان آن ها را یافت.

علامت بالینی:

بدون علامت تا خارش شدید

بزرگی غدد لنفاوی پس سر

تشخیص شپش سر:

وجود خارش ناحیه سر در جامعه آلوده به شپش

وجود ضایعات به صورت خارش جلدی با یا بدون

عفونت و وجود آدنوپاتی موضعی در ناحیه پشت گوش

و گردن

